以下為115年套組外加選項目之參考明細表；以價格9折計價（★加選前請再與健康中心確定價格，結帳金額會依當時公告價格為準）

序號	檢查項目	檢查細項	價　格 NT	可瞭解之疾病徵兆
儀器檢查：				
1	女性保健子宮頸抹片檢查	麗柏氏超薄抹片檢查	1700	使細胞能更均勻及清晰的分佈於玻片上，透過此種方式避免傳統抹片檢查上的限制，並能提升抹片檢查結果準確性
2		人類乳突瘤病毒檢查（HPV）	1550	可偵測出高危險種類的人類乳突病毒數量，得知自己是否為子宮頸癌的高危險族群
3	心臟超音波	專科醫師檢查心臟腔室及瓣膜	4500	心律不整、臨床上懷疑心臟發炎疾病、有心肌病變家庭史者
4	甲狀腺超音波	專科醫師儀器檢查甲狀腺	1200	檢查甲狀腺有無腫大、腫瘤等
5	腎臟超音波	專科醫師儀器檢查腎臟	1200	檢查腎臟有無囊腫或結石
6	頭動脈超音波	總頭、內頭及外頭動脈	2210	了解血管有無動脈硬化症、狹窄、阻塞等情形早期中風評估
7	乳房超音波(女性)	專科醫師儀器檢查乳房	1300	了解乳房組織是否有乳癌、良性纖維腺瘤、單純囊腫、纖維囊腫、結節
8	婦科超音波(女性)	專科醫師儀器檢查婦女下腹部骨盆腔內構造	900	檢查評估子宮卵巢及輸卵管大小、位置是否有異常或不正常之腫瘤(如卵巢囊腫、子宮肌瘤)和其他異常的發現(如子宮內膜增生)。
9	電腦斷層檢查	不需施打顯影劑，低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）	6000(不予折扣)	不需施打顯影劑，有快速、簡易、敏銳、低輻射等好處，突破傳統X光僅看到1公分以上肺癌的限制，可以找出更小病灶
10	電腦斷層檢查	心臟冠狀動脈鈣化指數分析	7500	不需施打顯影劑，CAC score被視為是反應冠狀動脈硬化程度的指標，可做為發生冠狀動脈血管疾病風險預測及預後評估，並據此調整生活型態，或進一步檢查及治療
11	電腦斷層檢查	心臟冠狀動脈血管攝影 (名額有限須提前預約且視當時疫情決定是否開放加選)	25000	需打顯影劑，藉由注射顯影劑及快速掃描得到完整之冠狀電腦斷層影像，使臨床醫師在評估心血管疾病時能迅速得到完整的血管狹窄鈣化資訊
12	核磁射磁振造影檢查(MRI) (視疫情變化及預約人數斟酌是否開放加選)	不需顯影劑，腦部磁振造影(MRI Without Contrast--Brain)	8450	包括大腦、小腦、中腦、延腦、腦下垂體、腦室，主要針對國人常見好發疾病如腦中風、顱內腫瘤等作偵測篩檢
13		不需顯影劑，頭頸動脈及全腦磁振造影	16800	包括大腦、小腦、中腦、延腦、腦下垂體、腦室、頭動脈血管3D立體影像檢查，完整呈現兩側內頸動脈與顱內血管是否有狹窄、腦中風、顱內腫瘤、動脈瘤及動靜脈畸形
14		不需顯影劑，頭部磁振造影	8450	包括鼻竇、咽喉、食管、甲狀腺、副甲狀腺與頭部淋巴結等結構之篩檢
15		不需顯影劑，腹部磁振造影	8450	包括篩檢肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟等器官是否有囊腫、腫瘤、息肉
16		不需顯影劑，腰椎磁振造影	8450	包括篩檢是否有椎間盤突出、骨病變、骨刺及脊椎移轉性腫瘤
17		不需顯影劑，骨盆腔磁振造影	8450	篩檢後腹腔、膀胱、男性攝護腺病變與腫瘤、女性子宮肌瘤、巧克力囊腫、子宮內膜增生、卵巢囊腫、卵巢癌等生殖器官病變
18		不需顯影劑，胸椎磁振造影	8450	包括篩檢是否有椎間盤突出、骨病變、骨刺及脊椎移轉性腫瘤
19	上消化道內視鏡胃鏡檢查 (視疫情變化及預約人數斟酌是否開放加選)	本院採用NBI窄頻式內視鏡	1950	食道、胃、十二指腸之腫瘤、潰瘍、發炎、息肉、糜爛
20	下消化道大腸鏡 (視疫情變化及預約人數斟酌是否開放加選)	本院採用NBI窄頻式內視鏡	2925	瞭解大腸內是否有炎症、潰瘍或癌肉等病變，或出血源以便做進一步之處置或治療
21	清腸瀉劑—(大腸鏡檢必使用之瀉劑)	保可淨(較新型的藥品，味道大眾易接受，利用高滲透壓促使體內的水分及電解質進入腸道進而增加蠕動，跟其他清腸藥比起來較溫和)若受檢人腎功能不佳則另擇其它瀉劑	576(不予折扣)	正常的大腸排空時間要34～35小時，甚至可以到72小時，因此需要清腸藥來幫助排空，如果清腸不佳，研究證明不只病灶偵測率下降，也會增加併發症、檢查時間、檢查不完全等等。
22	幽門桿菌檢查 (視疫情變化及預約人數斟酌是否開放加選)	碳-13尿素呼吸試驗可測出有無感染胃螺旋幽門桿菌	1508	為無毒性的尿素，口含進入與細菌接觸具安全、無痛、快速、精確等優點，
23	無痛腸胃鏡麻醉處置 (視疫情變化及預約人數斟酌是否開放加選)	腸胃內視鏡麻醉處置 (上、下消化道內視鏡一起檢查時可考慮選擇此處置)	6000(不予折扣)	由麻醉專科醫師及護理人員共同與腸胃專科醫師搭配執行)經由減痛舒適麻醉處置可輕鬆完成內視鏡檢查
24		單選大腸鏡或單選胃鏡內視鏡麻醉處置(二擇一)	4000(不予折扣)	
25	眼科精密檢查	視網膜光學斷層掃描儀（OCT）	1200	眼科的診斷儀器，除了眼睛功能上的檢查，亦更進一步的透過眼底斷層掃描及結構分析，來探討視網膜及視神經病變的狀況，甚至經由分析來作早期病變的預測（ 如青光眼 ），或是評估治療前的參考，及預後的狀況。
抽血項目：				
1	癌症篩檢：理想的癌症指數應具有診斷的高敏感及高特異性，以早期偵測癌症，並能精確地評估癌症預後。目前尚無任一癌症指數能達到這個理想的標準，所有的癌症指數其特異性均非百分之百，所以建議應搭配醫師診療或專業儀器檢測來協助診斷	胃癌非特異性篩檢(CA72-4)	800	CA72-4這種高分子量的腫瘤相關性醣蛋白，對人類消化系統胃癌細胞具有特異性
2		前列腺特定抗原PSA(男性)	520	攝護腺特定抗原(PSA)是一種只存在於攝護腺上皮細胞的蛋白質，可方便地抽血測量，作為早期偵測泌尿道感染、攝護腺發炎、良性攝護腺肥大、攝護腺癌得參考指標；幫助血清沒有任何臨床症狀之前，早期發現攝護腺癌病變，以便早期治療，提高治癒率。
3		胰臟癌篩檢(CA199)	520	是一種醣化蛋白質，存在人體的胰臟腺管及唾液腺上皮細胞。許多消化道的腫瘤如胰臟癌、大腸癌或膽管癌均會表現CA199測值上升
4		鼻咽 檢查-EBV IgA	702	敏感度及特異性均高達95%以上，可精準的偵測出EBV病毒是否存在
5		神經特異烯醇酶(NSE)	400	肺癌(小細胞肺癌)參考指標
6	甲狀腺功能檢查	甲狀腺促素TSH	312	當甲狀腺功能異常時，可用TSH來區分是原發性或次發性
7		游離性四碘甲狀腺素FT4	260	值高時，可能為懷孕、急性甲狀腺炎；值偏低時，可能為甲狀腺機能低下、服用降壓藥或甲狀腺抑制劑
8	肝癌篩檢	異常凝血酶原檢測（PIVKA-Ⅱ）	1258	評估是否有肝細胞癌
9	肝炎檢測	A型肝炎抗體(Anti-HAV IgG)	293	A型肝炎是經口傳染，主要是經由遭污染之食物來傳染，anti-HAV IgG若顯現陽性反應，表示體內有抗體，或曾感染過A型肝炎或者注射過A型肝炎疫苗
10		C型肝炎抗體(Anti-HCV)	325	當感染C型肝炎病毒（HCV）後，體內會產生C型肝炎病毒抗體（Anti-HCV），這些抗體屬於非保護性抗體，並不能消除體內的C型肝炎病毒；但在診斷上可以作為「是否感染C型肝炎病毒」的指標。如檢查呈現陽性反應，表示過去曾遭C型肝炎病毒感染，其病毒可能仍存留在體內並具傳染力，可經由血液或體液將C型肝炎病毒傳染給他人。
11	組織發炎指數	高度性C-反應性蛋白(hs-CRP)	358	C-反應蛋白(CRP)是由肝臟細胞所產生的特殊蛋白，是發炎反應的指標，當身體有受傷、局部缺血等致組織壞死、感染或急性發炎疾病時，血液中的濃度會升高許多倍
12		類風濕性關節炎因子(RA)	358	檢查是否罹患類風濕性關節炎因子，RA（RF）因子是一種對人體本身的兩種球蛋白的一種蛋白或份所產生的自體抗體，因此在自體免疫疾病病人的血液中的RA因子濃度會增加
13	心血管疾病指標	同半胱氨酸(Homocysteine)	520	高量的同半胱胺酸是血管病變的危險因子，會造成血管上皮損傷、刺激發炎反應產生以及加速氧化型低密度脂蛋白形成，這些作用都會造成血管壁硬化發生，加速產生栓塞
14	維生素檢查	維生素D檢查(25-OH Vitamin D 濃度)	920	維生素 D 若缺乏，可能會導致佝僂症、骨質疏鬆及增加骨折的風險等，近年來維生素 D 在骨骼以外的作用逐漸被發現，維生素 D 缺乏與許多疾病有相關性，例如：肌無力、癌症、免疫系統（多發性硬化症、發炎性大腸疾病、第一型糖尿病、肺結核、上呼吸道感染）、心血管系統（高血壓、心血管疾病）、第二型糖尿病、神經功能（思覺失調症、憂鬱、阿茲海默症）及不良的懷孕結果（妊娠糖尿病、子癇前症、體重不足嬰兒）等，都可能跟維生素 D 有關。
15	過敏原檢驗套組	過敏原檢測	2106	包括D1屋塵螨、D2粉塵螨、D201無爪螨、E1貓毛屑、E5狗毛屑、E85綠毛屑、E86鴨毛屑、F1蛋白、F2牛奶、F3鮭魚、F4小麥、F13花生、F14大豆、F20杏仁、F23螃蟹、F24蝦子、F25香菇、F31胡蘆蔔、F35馬鈴薯、F37孔雀蛤、F41鮭魚、F45酵母菌、F47大蒜、F75蛋黃、F81乳酪(乾酪型)、F84奇異果、F300羊奶、G2狗牙根草、G6牧草、I6德國蟑螂、I207亞洲蟑螂、K82乳膠、M1青黴菌、M2芽枝黴菌、M3煙色麴菌、M5白色念珠菌、M6交鏈黴菌、W1豬草、W6艾蒿、W12葡萄柱植物等40種。
16	血糖檢測	糖化血色素(HBAIC)	260	可了解糖尿病、內分泌疾病並可了解三個月內的血糖變化。
17	血糖代謝系統	飯前胰島素(AC Insulin)	156	目前胰島素免疫分析法已被廣泛用於提供補充性資訊，首先為用於糖尿病患者之診斷，及用於空腹低血糖症之鑑別診斷，可與飯前血糖一起評估以了解胰島素抗性指數
18	麻疹抗體檢查	麻疹抗體Measles virus IgG	312	麻疹具有高傳染力經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，不曾得過麻疹或者不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹
19	水痘抗體檢查	水痘(VZ IgG)	260	若呈陽性，表示體內已經有保護性的水痘抗體，若為自然感染一般為終身免疫，若為注射疫苗後產生之抗體，可減少受到感染之機會。
20	德國麻疹抗體篩檢	德國麻疹抗體篩檢(Rubella IgG)免疫球蛋白G型抗體	312	瞭解有無德國麻疹抗體產生，評估是否接種疫苗
21	重金屬檢查	鉛 Lead， Pb(檢查血中鉛)	520	鉛是一種有毒金屬，不僅使用廣泛且現已造成嚴重環境污染和健康問題，若中毒會導致：ALA去水解酵素受抑制、腹食、胎兒神經系統缺損、神經傳導速度減緩、抑制Vitamin-D代謝活性、腹痛、嘔吐、過敏、呆滯、腦病變、貧血、周邊神經病變(如垂腕或垂足等伸肌麻痺或感覺異常)、小球性低血色素貧血(排除缺鐵性貧血及海洋性貧血)、腎臟病變等。
22	重金屬檢查	尿中鎘Cd（Cadmium）	520	吸入鎘所導致的急性呼吸症狀，包括肺水腫,增生性間質性肺炎,和心血管循環性休克,永久性肺損傷都可能會發生。鎘可自食物而攝入或含鎘的容器而得到。急性中毒症狀是在食入後三十分鐘內會突然發生強烈的腸胃道症狀。
23	營養素評估	維生素 B12（Vitamin B12）	234	也稱為鈷胺或氰鈷胺素（Cobalamin/Cyanocobalamin），可以協助醣類、蛋白質和脂肪的代謝；維持神經系統的正常功能以幫助保護與修復神經末端並可促進紅血球的形成和再生，預防貧血，還可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。
24	性病篩檢	人類免疫缺乏病毒抗體(Anti-HIV)	312	愛滋病篩檢
25	抗核抗體篩檢	Anti-Nuclear Ab(ANA)紅斑性狼瘡	429	此項檢查對全身性紅斑性狼瘡(SLE)有高敏感性，是一種慢性炎症性疾患，發病以育齡期婦女佔比例最高，它可侵犯到許多的器官和系統，因此在臨床方面可以表現出許多種症狀如皮疹或伴有指（趾）端或其他部位的血管炎樣皮疹狀。